Imprimer

FICHE TECHNIQUE LES ATOUTS

UNIX

Présentation

Fongicide céréales à base de cyprodinil

Voir aussi :

Notice
FDS (Fiche de données de sécurité).

Caractéristiques générales

Type de traitement	TRAITEMENT FONGICIDE
N° d'AV	9300009
Composition	75 % cyprodinil
Famille(s) chimique(s)	Anilinopyrimidines
Formulation	WG Granulé à disperser dans l'eau (granulé dispersable)
Mode d'action	Curatif - En début d'attaque du piétin-verse sur tige. Sur les maladies foliaires Préventif - Sur piétin-verse et maladies foliaires Systémique Translaminaire
Mode d'application	Traitement des parties aériennes

Préconisations d'emploi

Selectionnez ici une culture

Choisissez un usage :

Tous les usages

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Nbre d'appli. max.	Délai avant récolte	Zone non traitée	Délai de rentrée
BLE	Oïdium	0,8kg/ha			42 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
BLE	Piétin-verse	1kg/ha	Dose recommandée en situation de forte pression piétin-verse.		42 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
BLE	Piétin-verse	0,6kg/ha	En association avec un produit à base de strobilurine (plus triazole).		42 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
BLE	Piétin-verse	0,8kg/ha	En association avec une triazole.		42 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
ORGE	Helminthosporiose (D. teres)	0,5kg/ha	Très bonne synergie de l'association UNIX+AMISTAR		45 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
					45 Jours		

ORGE	Oïdium	0,5kg/ha			(24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
ORGE	Rhynchosporiose	0,5kg/ha	Très bonne synergie de l'association UNIX+AMISTAR		45 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
TRITICALE	Oïdium	1kg/ha			42 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)
TRITICALE	Piétin-verse	1kg/ha			42 Jours (24 heures entre un traitement fongicide et un traitement insecticide)	5 m (selon arrêté) minimum	6 Heures (selon arrêté)

Mode d'emploi sur l'ensemble des usages autorisés

Précautions à prendre pour l'utilisateur	Bien respecter les conseils indiqués sur l'étiquette.
Précautions à prendre pour l'environnement	Bien vérifier les compatibilités avant mise en oeuvre de l'UNIX
Préparation de la bouillie	1-Remplir d'eau la cuve du pulvérisateur aux 2/3. 2- Mettre l'agitateur en marche. 3-Verser la quantité nécessaire d'UNIX (-chargement par le haut:enlever l'éventuel tamis avant de verser UNIX -chargement par un bac incorporateur :verser directement UNIX dans le bac vide) 4-Maintenir l'agitation. 5-Compléter le remplissage de la cuve.
Conditions particulières de mise en œuvre	EN CAS DE MELANGES : Introduire UNIX en premier et attendre la dissolution complète d'UNIX avant d'introduire l'autre produit. Ne pas faire de préempâtage avec UNIX, verser directement le produit dans le pulvérisateur
Pulvérisation	- Comme pour tous les produits phytosanitaires: .ne pas laisser stagner la bouillie dans le puvérisateur. .maintenir l'agitation pendant le traitement - Vider la totalité de la 1ère cuve avant d'effectuer un 2eme mélange. - Eviter de traiter par température supérieure à 25°c. - L'activité d'UNIX est indépendante de l'hygrométrie
Type de buses	A fente A limitation de dérive
Volume d'eau	150 à 300 litres d'eau à l'hectare avec un équipement standard de buses à fente
Pression	La pression sera comprise entre 1.7 et 2.5 bars avec ce type de buses
Délai sans pluie	2 heures suivant le traitement:
Mélanges	Respecter la réglementation en vigueur et les recommandations des guides de bonnes pratiques officiels disponibles sur le site : **http://e-phy.agriculture.gouv.fr**
Commentaire sur les préconisations et le mode d'emploi	Unix possède aussi une activité intéressante sur microdochium nivale et sur l'helminthosporiose du blé (H.T.R.) Utilisation en association avec les triazoles ou les strobilurines sur blé comme sur orge pour un spectre complet sur les maladies du pied et des feuilles.
Précaution à prendre pour le stockage, la destruction du produit et de l'emballage	Reportez-vous à l'étiquette

Informations réglementaires

Classement de la formulation	Sans classement.
Phrase(s) de risque	
Mention(s) obligatoire(s)	Dangereux pour les organismes aquatiques
Conseil(s) de prudence	Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres au minimum par rapport aux points d'eau .(distance minimale obligatoire à respecter en attendant une notification officielle) S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

	S 61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de donnée de sécurité. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Précautions à prendre pour l'utilisateur	Bien respecter les conseils indiqués sur l'étiquette.
Usages homologués	Pour les consulter, **cliquez ici**

Urgences

En cas d'urgence appeler le 15 ou le centre anti-poison puis signalez vos symptômes au réseau Phyt'attitude N° vert 0 800 887 887(appel gratuit d'après un poste fixe) - En cas d'accident de transport composer le 06 11 07 32 81 Numéro d'urgence Syngenta Agro N° vert 0 800 803 264.

Mentions légales

Produit homologué par	SYNGENTA Agro S.A.S.
Marque propriété de	® Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

haut de page RETOUR À LA LISTE

Copyright Syngenta Agro SAS © 2001 - 2008 Tous droits réservés